

المرشد الزراعي في:

زراعة وإنتاج

# الفول السوداني

محمد الحسيني



# مكتبة إبراهيم

## للطباعة والنشر والتوزيع

٢٦ شارع محمد قريش - الترمه -  
مصر الجديدة - القاهرة  
٦٣٧٩٨٦٣ - ٦٣٨٩٣٧٢ فاكس : ٦٣٨٠٤٨٣

اسم الكتاب

المرشد الزراعي في  
زراعة وإنتاج الفول السوداني

اسم المؤلف

محمد الحسيني

تصميم الغلاف

إبراهيم محمد

رقم الإيداع

٢٠٠٦/١٨٨٩

977 - 271 - 790 - 5

جميع الحقوق محفوظة للناس

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو اقتباس  
أو جزء من الكتاب أو تعديله أو أية وسيلة ميكانيكية  
أو إلكترونية بدون إذن كتابي مسبق من الناشر.

تطلب جميع مطبوعاتنا من وكيلنا الوحيد بالملكة العربية السعودية

مكتبة الساعي للنشر والتوزيع

م. ب. ٥٠١٥٩ الرياض ١١٥٣٣ - هاتف : ٤٥٢٣٦٨ / ٤٥٢١٩٦٦ فاكس : ٤٥٢٠٩٤٣

جدة - تليفون وفاكس : ٢٩٩٤٣٦٩



مطابع العصور الحديثة بالقاهرة ت : ٦٦٥١٠١٢ فاكس : ٦٦٥١٥٩٩

Web site : [www.ibnsina-eg.com](http://www.ibnsina-eg.com) E-mail : [info@ibnsina-eg.com](mailto:info@ibnsina-eg.com)

## مقدمة

رغم أن الفول السوداني من النباتات البقولية المعروفة بفناها من البروتين النباتي إلا أنه يتفوق على كثير من البقول المعروفة لنا مثل الفول المدمس ٩.٢ والعدس ٢٤ والبسلة ٢٣.٨ واللوبياء ٢١٪ ولا يتفوق عليه غير فول الصويا ٣٤.٩٪ لكل ١٠٠ جم، حيث يحتوى على ٢٦.٩٪ وهى نسبة عالية جعلته من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية بالإضافة للمنتجات الثانوية الهامة التى يتم استخلاصها منه مثل زيت فول السودانى وزبدة الفول السودانى المطلوبين عالمياً وخاصة للسوق الأوربية، فقد بلغت كمية الصادرات من زيت فول الصويا خلال عام ٢٠٠٢ - ١١.٩٣ ألف طن بما يوازى قيمته حوالى ٧.٢٥ مليون دولار.

وخلال السنوات الأخيرة توصلت الأبحاث العالمية إلى الدور الهام لمركب الأرجنين ودوره الكبير فى تنشيط دفاعات الجسم ودعم الجهاز المناعى للشخص السليم ضد كثير من الأمراض الفتاكة التى لم تتوصل الأبحاث إلى وسيلة فعالة للقضاء عليها - وسريعاً ما تم طرح كبسولات الأرجنين بالأسواق.

وقد لوحظ أن الفول السودانى يحتوى على حمض أمينى (الأرجنين) بتركيزات عالية مما جعل العالم يتجه إلى الفول السودانى كأحد المحاصيل الاقتصادية الهامة وزاد التعامل معه عالمياً.

ولذلك كانت هذه النشرة للمساهمة فى نشر زراعة الفول السودانى كأحد المحاصيل الاقتصادية الهامة التى تجود فى الأراضى الجديدة.

والله ولى التوفيق ،

تحريراً فى ٢٠٠٥/١٢/١

محمد الحسينى

## القول السوداني

القول السوداني من المحاصيل الصيفية الرئيسية في الأراضي الجديدة والذي يزرع من أجل ثماره أو من أجل الحصول منها على الزيت.. ويعتبر من محاصيل التصدير الهامة التي تعود على المنتج بربح وفير، ويستهلك منه حوالي ٦٥ - ٧٠٪ ويصدر الباقي إلى الدول الأوروبية والعربية وتعتمد العديد من الصناعات على زيت قول السوداني مثل عمل المستحلبات الغذائية للأطفال أو يستعمل كدهان موضعي للمفاصل المصابة بالروماتيزم ويدخل في صناعة المستحضرات الطبية بدلاً من زيت الزيتون.. كما تصنع منه زبدة السوداني والتي تستخدم في العديد من الوجبات كعمل صلصات دهنية أو كبديل بروتيني مغذي بدلاً من اللحوم للأفراد الذين لا يستطيعون مضغ اللحوم.



الموطن الأصلي .. تعتبر أمريكا الجنوبية الموطن الأصلي للقول السوداني، غير أن الهند اليوم من الدول الرائدة في إنتاج القول السوداني حيث تنتج حوالي ٤٠٪ من إنتاج العالم الكلى يليها الصين وأمريكا . وينتج السودان في المتوسط حوالي ٦,٧٪ من إنتاج العالم وتعتبر رابع دولة في

العالم والأولى في الإنتاج العربي.. وأهم الأسواق المستوردة لل فول  
السوداني- المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا .

الاحتياجات البيئية .. يحتاج الفول السوداني إلى جو دافئ وكمية كبيرة  
من ضوء الشمس ويناسب الزراعة الأرض الخفيفة الرملية والصفراء جيدة  
الصرف حيث أن الأرض سيئة الصرف تسبب تغير لون الثمار وإصابتها  
بالأعفان كما لا تتجح زراعته في الأراضي الطينية أو الثقيلة .

### محصول الفول السوداني الصيفي عام ٢٠٠٣

المحافظات	أراضي قلبية			أراضي جليدية			الإجمالي		
	المساحة	الإنتاجية	الإنتاج	المساحة	الإنتاجية	الإنتاج	المساحة	الإنتاجية	الإنتاج
	فدان	طن	طن	فدان	طن	طن	فدان	طن	طن
البحيرة	١٤٥٧	١,٢٩٠	٥٧٤٨	—	—	—	١٤٥٧	١,٢٩٠	٥٧٤٨
الشرقية	٤٦٠٧	١,٣٤٧	٦٢٠٤	١٩٦٥	١,٢٦٦	٨٧٧٦	١١٥٦٣	١,٢٩٦	١٤٩٨٠
الإسماعيلية	٧١٨٠	١,٥٣٦	١١٠٣٠	٩٨٩٩	١,٣٧٨	١٣٦٣٧	١٧٠٧٩	١,٤٤٤	٢٤٦٦٧
السويس	٤٧	٠,٩٣٦	٤٤	—	—	—	—	٠,٩٣٦	٤٤
المنوفية	٢٢٤	١,١٠٦	٢٤٨	١٧٠	١,١٠٠	١٨٧	٣٩٤	١,١٠٤	٤٣٥
القليوبية	٧٣٦	١,٦٦٧	١٢٢٧	—	—	—	٧٣٦	١,٦٦٧	١٢٢٧
جملة الوجه البحري	١٧٢٥١	١,٤٢٠	٢٤٥٠١	١٧٠٢٥	١,٣٢٧	٢٢٦٠٠	٣٤٢٧٦	١,٣٧٤	٤٧١٠١
الجيزة	٥٥٢٨	١,٥٦٤	٨٦٤٧	٢٢١	٠,٧٥٦	١٦٦	٥٧٤٩	١,٥٢٣	٨٨١٣
بنى سويف	٢٣٧	١,٢٤١	٢٩٤	١٤٥٠	١,١٤٦	١٦٦١	١٦٨٧	١,١٥٩	١٩٥٥٤
الفيوم	٧٣٤	٠,٥٥٢	٤٠٥	—	—	—	٧٣٤	٠,٥٥٢	٤٠٥
المنيا	٤٤٣٧	١,١٠٦	٤٩٠٩	٧٣٠٣	١,٢٥٥	٩١٦٧	١١٧٤٠	١,١٩٩	١٤٠٧٦
جملة مصر الوسطى	١٠٩٣٦	١,٣٠٣	١٤٢٥٥	٤٩٧٤	١,٢٢٥	١٠٩٩٤	١٩٩١٠	١,٢٦٨	٢٥٢٤٩
أسيوط	٢١٨٦	١,٥٣٥	٣٣٥٦	١٠٣٨	١,٤٨٣	١٥٣٩	٣٢٢٤	١,٥٣٨	٧٢٩١
سوهاج	٣٧٥٥	١,٦١٨	٦٠٦٧	٩٨٦	١,٢٣٢	١٢١٥	٤٧٤	١,٥٣٨	٧٢٧١

المحافظات	أراضي قديمة			أراضي جديدة			الإجمالي		
	المساحة	الإنتاجية	الإنتاج	المساحة	الإنتاجية	الإنتاج	المساحة	الإنتاجية	الإنتاج
	فدان	طن	طن	فدان	طن	طن	فدان	طن	طن
فتا	٩٧	١,٥٨٨	١٥٤	١٠	١,٥١٠	١٥	٤١	١,٥٧٩	١٦٩
أسوان	٣٨٠	١,٣٢١	٤٠٢	٧١	٠,٨٠٣	٥٧	١٠٧	١,٣٣٩	٤٥٩
مدينة الأقصر	٢٠٦	١,٤٦١	٣٠١	٥	١,٤١٠	٧	٤٥١	١,٤٦٠	٣٠٨
جبل مصر العليا	٦٦٢٤	١,٥٦٨	١٠٣٨٩	٢١١٠	١,٣٤٣	٢٨٣٣	٢١١	١,٥١٤	١٣٢٢٢
إجمالي داخل الوادي	٣٤٨١١	١,٤١٢	٤٩١٤٥	٢٨١٠٩	١,٢٩٦	٣٦٤٢٧	٨٧٣٤	١,٣٦٠	٨٥٥٧٢
الوادي الجديد	-	-	-	١٧٠	٠,٩٧١	١٦٥	١٧٠	٠,٩٧١	١٦٥
مطروح	-	-	-	٤٨٠	١,٠٠٠	٤٨٠	٤٨٠	١,٠٠٠	٤٨٠
النوبارية	-	-	-	٨٣٦٤١	١,٣١١	١٠٩٦١٩	٨٣٦٤١	١,٣١١	١٠٩٦١
إجمالي خارج الوادي	-	-	-	٨٤٢٩١	١,٣٠٨	١١٠٢٦٤	٨٤٢٩١	١,٣٠٨	٩
إجمالي الجمهورية	٣٤٨١١	١,٤١٢	٤٩١٤٥	١١٢٤٠٠	١,٣٠٥	١٤٦٦٩١	٤٧٢١١	١,٣٣٠١	١١٠٢٦



## القيمة الغذائية لل فول السوداني

تركيب ١٠٠ جم من الجزء المأكول من الفول السوداني

نياسين مجم	ريبوفلافين مجم	ثيامين مجم	ح مجم	ك مجم	كا مجم	لي مجم	النسبة المئوية					سعرات لكل ١٠٠ جرام
							كربوهيدرات	رمان	دهن	بروتين	ماء	
١٦.٢	٠.١٣	٠.٣	١.٩	٣٩٣	٧٤	٢.٤	٢٣.٦	٢.٧	٤٤.٢	٢٦.٩	٢.٦	٥٥٩



## الفوائد الصحية للفول السوداني



١- احتوائه على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة - وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن الفول السوداني يقلل من مستويات الكوليسترول الكلى في الدم نظراً لاحتوائه على مادة «ريزفيراترول» التي أثبتت فاعليتها في المحافظة على سلامة القلب من الأمراض، مما يجعله أحد أنواع الأطعمة المفيدة التي تسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض القلبية .



٢- احتوائه على نسبة عالية من البروتينات والتي تحتوى على حمض أمينى «الأرجنين» بتركيزات عالية، ويستخدمه الجسم لإنتاج مركب أول أكسيد النيتروجين وكلما زاد أول أكسيد النيتروجين كلما ساعد فى تنشيط دفاعات الجسم ودعم الجهاز المناعى للشخص السليم، وقد زاد الاهتمام بهذا الحمض الأمينى لما له من فوائد عديدة منها :

أ- تنظيم الدورة الدموية وضغط الدم حيث أنه يوسع الأوعية الدموية مما يساعد فى خفض ضغط الدم.

ب- ينشط خلايا الدم البيضاء مما يساهم فى مقاومة الممرطانات والأمراض المعدية مثل السل والوقاية منها، ويساعد فى التئام الجروح .

ج- تحسين ضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم .

د- تحسين الأداء الجنسى وزيادة الرغبة لدى الجنسين .

هـ- يخفض مخاطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر الذى يصيب كبار السن فوق الأربعين.

٣- احتوائه على المكونات الفعالة وبعض الفيتامينات التى أهمها (ب١)، (ب٢)، وحمض الجلوتامين (يؤدى للحصول على بروتين كامل فى الغذاء) حيث تعمل كلها على المحافظة على سلامة الجهاز العصبى والمساعدة على الهضم وخاصة الكربوهيدرات .

٤- تناول حبات فول السودانى بصورة منتظمة يساعد فى تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة (١٤٠ جرام فى الأسبوع) وذلك لأنها من أفضل المصادر الغنية بالألياف الغذائية والأحماض الدهنية الغير مشبعة.

٥- يتشابه مع المكسرات لدورها فى تحسين حساسية الجسم لهرمون الأنسولين المنظم للسكر أو تقليل مستويات الكوليسترول الكلية فى الدم .



٦- احتوائه على نسبة عالية ووفيرة من الألياف والبروتينات والدهون النباتية لذلك فهو مصدر غنى بالطاقة، وهذه الطاقة مطلوبة في أداء العملية الجنسية كما أنه علاج فعال يمنع تساقط الشعر وحماية العضلات من الضعف ويقوى الذاكرة .



هذه النملة في حاجة لطاقة لتعمل ذلك

٧- وعن د/ مصطفى نوفل استاذ تكنولوجيا التغذية بكلية العلوم - جامعة الأزهر ... » أن استخدام جرعة من ٢ ملعقة طعام من الفول السوداني - تضمن للجسم الحصول على ٧٪ من حاجة الجسم اليومية من البوتاسيوم ، ٦٪ من الحديد وأكثر من ٣٪ كالسيوم ، ٨٪ فوسفور، ١٥ مللجرام كبريت .


وهذه تفيد في تحويل مخلفات الهضم الضارة إلى مركبات يمكن التخلص منها خارج الجهاز الهضمي - وعلى النياسين الذى يقى الجسم من المشاكل الصحية مثل الجلدية والهضمية والعصبية .



## الوصف النباتى

نبات عشبي حولى بقولى والنبات قائم النمو والفروع الجانبية مائلة قليلاً والجذر وتدى متعمق وعليه عقد جذرية .. الأوراق مركبة ريشية تحتوى على زوجين من الوريقات المتقابلة ..

الأزهار مفردة أو فى مجموعات ٢-٣ أزهار ولونها أصفر .. والثمرة على شكل قرن يحتوى بداخله على ١-٥ بذور ..



بعد الإخصاب ينمو الحامل الثمري متجهًا إلى التربة ويخترق السطح ويتعمق لمسافة ٢-٧ سم .. حيث تنمو الثمار تحت التربة.



الثمار التي تنمو تحت التربة



الأزهار الصفراء



الثمرة

الثمرة على  
شكل قرن



القرن داخله البذور وتشاهد القشرة الداخلية باللون البنى الفاتح المحمر

### الأنصاف:

#### ● جيزة (٤) :

- ثمار كبيرة الحجم - صنف رومى - متوسط الإنتاج .
- متوسط النضج ١٤٥ - ١٥٠ يوم .

#### ● جيزة (٥) :

- صنف رومى ممتاز الثمار بكبر الحجم وهو من محاصيل التصدير .
- إنتاج مرتفع .
- صنف مبكر ١٢٠ يوم ..
- شديد التحمل للإصابة بالأمراض .

#### ● جيزة (٦) :

- صنف مستنبت حديث له نمو قائم ممتاز بعدم نمو البذور داخل القرن
- عند تأخر الحصاد كما فى صنف جيزة ٥ .

- إنتاج مرتفع وارتفاع نسبة التصافي لقلة سمك القشرة.

- مبكر في النضج ١١٠ - ١٢٠ يوم ..

• إسماعيلية (١) :

- صنف مستتبط حديث له نمو قائم .

- إنتاج مرتفع .

- يمتاز بوجود طور السكون للبذرة داخل القرون عند تأخر الحصاد،

- تحمله للإصابة بأمراض الأعفان والتبقعات.



### ميعاد الزراعة



•• انسب ميعاد للزراعة من منتصف إبريل إلى منتصف مايو.

•• الصنف جيزة ٥ تمتد فترة زراعته حتى الأسبوع الأول من يونيو (التأخير عن هذه المواعيد يؤدي إلى زيادة نسبة القرون الضامرة والفارغة).

### معدل التقاوى،

- جيزة ٤ : ٥٠ كجم ثمار أو ٣٠ - ٣٥ كجم بذرة .

- جيزة ٥ : ٧٥ ثمار أو ٤٥ - ٥٠ كجم بذرة أو أردب.



- جيزة ٦ وصنف الإسماعيلية ١ كما فى جيزة ٥ .



### \* ملاحظات هامة \*

- يفضل الزراعة بالبذرة لتسريع الإنبات وحمايتها من الإصابة بالأمراض .
- تعامل البذرة بالمطهرات قبل الزراعة بحوالى ٢٤ ساعة بالمواد الآتية فيتافاكس ثيرام - أوالريزوليكتس T أو التوبسين M بمعدل ٣ جم/ كجم بذرة.
- تعامل البذور باللقاح البكتيرى المناسب (العقدين) قبل الزراعة مباشرة.
- فى حالة إضافة العقدين بعد معاملة البذور بالمطهرات فتضاعف كمية العقدين المضافة (٢-٣ كيس للفدان) وتضاف للأرض وليس مع البذرة بالمطهرات بعد خلطهما بالرمل لتجانس التوزيع .. كما تضاعف الكمية فى حالة الأراضى الجديدة المستصلحة.

## التلقيح البكتيرى للقول السوداني :

يحقق التلقيح البكتيرى للنبات فوائد عديدة مثل:

- ١- يؤدي لخفض معدلات الأسمدة الأزوتية المضافة .
- ٢- زيادة المحصول وتحسين نوعيته .
- ٣- زيادة محتوى البذور من البروتين .
- ٤- زيادة خصوبة التربة واستفادة المحصول التالى .

### • طريقة معاملة البذور بالعقدين :

- ١- إضافة ٥٠ جم من الصمغ العربى إلى ٢ كوب ماء لعمل محلول يرش على البذور بعد وضعها على فرشاة من المشمع فى مكان ظليل وتقلب البذور حتى يتم بلل سطحها بالمحلول.
- ٢- ينثر العقدين على البذرة المبللة بالمحلول وهى على المشمع وتترك قليلاً لتجف ثم تزرع مباشرة مع الري عقب الزراعة مباشرة ويجب أن يكون الخلط بعيداً عن الشمس .
- ٣- تعطى جرعة تشيطية من السماد الأزوتى حوالى ١٥-٢٠ كجم أزوت/ الفدان عند الزراعة أو مع الري الأولى وفي حالة نجاح التلقيح البكتيرى يكتفى بهذه الجرعة التشيطية.

### • تحديد مدى نجاح اللقاح البكتيرى :

بعد ٢٥ يوم من الزراعة تفحص جذور بعض النباتات فى أجزاء مختلفة من الحقل وهى حالة تكوين ١٠ عقدة / نبات ذات لون أحمر من الداخل يعتبر التلقيح ناجحاً .. ويتم التلقيح سنوياً لضمان فعاليته ..

## إعداد الأرض للزراعة :

### • زراعة الأرض لأول مرة :

تحرث الأرض الرملية حرثاً واحدة والصفراء تحرث حرثتين متعامدتين ثم تزحف وتخطط على مدى ١٢ خط / قصبتين (٦٠ سم بين الخطوط) وتروى الأرض رية خفيفة وتزرع فى اليوم التالى ثم تروى رية الزراعة .



## • زراعة الأرض التى سبق زراعتها :

فى حالة وجود الحشائش بكثرة ينصح برى الأرض رية كدابة قبل الحرث للتخلص من نسبة كبيرة من الحشائش ثم تخطط وتزرع كما سبق.

## التسميد :

### ١- مع إعداد الأرض للزراعة :

أ-التسميد العضوى ضرورى فى الأرض الرملية والصفراء وخاصة عند الزراعة بغرض التصدير مع مراعاة خلوه من الثيماتودا وبذور الحشائش وأن يكون متحلل فيضاف بمعدل ٢٠ متر مكعب للفدان .

ب- الجبس الزراعى : تؤدى إضافة الجبس الزراعى للفلول السودانى للحصول على إنتاج له خواص جيدة مثل امتلاء القرون وكبير حجم وصلابة القرون .. ويرجع ذلك لتوافر عنصر الكالسيوم الغذائى به .. بالإضافة لتوفير مهد مناسب لنمو البذرة ويضاف بمعدل ربع طن مع الحرث ويقلب جيداً بالتربة وإذا لم يضاف مع خدمة الأرض بمعدل نصف طن للفدان عند بداية التزهير (٢٥-٤٠) يوم من الزراعة حيث يضاف أسفل النباتات مباشرة ليتواجد فى مناطق تكوين القرون.

ج- السوبر فوسفات الأحادى ١٥٪ يضاف بمعدل ٢٠٠ كجم / فدان.

## طريقة الزراعة :



### • الزراعة تحت نظام الري الحديث:

تزرع البذور في سطور تبعد ٦٠ سم عن بعضها ، ١٠ سم بين الجور للأصناف جيزة (٥) و جيزة (٦) ، اسماعيلية (١) على أن يتم التريديم حول النباتات قبل التزهير.

### • الزراعة تحت نظام الري بالراحة :

تتم الزراعة على خطوط في جور على أبعاد ٢٠ سم (جيزة ٤) و ١٠ سم (جيزة ٥)، جيزة ٦ ، واسماعيلية ١ وتتم الزراعة في الثلث السفلى مع وضع بذرة واحدة في الجورة ثم تروى رية الزراعة ويعاد الري بعد (٥-٦ أيام) للمساعدة على اكتمال الإنبات .

### • العزيق والتريديم:

يتم إجراء من عزقتين إلى ثلاثة مع التريديم حول النباتات حتى يصبح النبات في وسط الخط مما يساعد على اختراق الإبر بالتربة وتكوين القرون، كما تؤدي هذه العزقات إلى التخلص من الحشائش .

### • الدورة الزراعية :

يجب عدم زراعة الفول السوداني في نفس الأرض إلا بعد مرور ٢-٣ سنوات حتى يساعد ذلك على تقليل الإصابة بالأمراض وكذا تحسين نوعية الثمار.

### • الري :

مراعاة الري باعتدال حتى لا تسبب الزيادة في انتشار الأمراض.. ويكون الري بمعدل ٤-٦ أيام في المراحل الأولى من نمو النباتات ثم تطول الفترة مع زيادة النمو إلى ١٠-١٢ يوم حسب الظروف الجوية، ويوقف الري عند اكتمال النضج وقبل الحصاد بحوالي أسبوع وفي حالة الري بالرش بالأراضي الجديدة فيراعى تقليل المياه بقدر الإمكان ليكون الري يوم بعد الآخر على أن يضاف للضدان في حدود من (٢٥-٣٠) من المياه في كل رية

وتطول الفترة بزيادة حجم النباتات لتصل إلى يومين مع مراعاة عدم تعطيش النباتات خلال فترة تكوين البذور والقرون .

## ٢- التسميد بعد الزراعة :

### أ- التسميد فى الأراضى القديمة :

#### ● التسميد الأزوتى :

- ٢٠ وحدة أزوت نصفها عند الزراعة والنصف الثانى بعد الدفعة الأولى بشهر وفى حالة نجاح التلقيح البكتيرى يكتفى بالدفعة الأولى عند الزراعة.

- ٤٥ وحدة أزوت فى الأراضى الفقيرة والتى تمت زراعتها فترة قصيرة، وتضاف على عدة دفعات تحت ظروف الري بالغمر وال٦ دفعات تحت نظام الري بالرش حتى عمر ٥٠ يوم من الزراعة .

- سماد نترات الكالسيوم .

- يؤدى الكالسيوم إلى إنتاج فول سودانى ممتلئ القرون وذو مواصفات تصديرية جيدة ولذلك يضاف خلال فترة التزهير وتكوين القرون شيكارتين نترات كالسيوم / فدان

#### ● التسميد البوتاسى:

- يحتاج الفدان إلى ٢٤ وحدة بوا ( ٥٠ كجم سماد سلفات البوتاسيوم ٤٨٪) وتضاف هذه الكمية تكبيشاً مع الدفعة الأولى من السماد الأزوتى (عند الزراعة) أو تضاف أثناء خدمة الأرض للزراعة.

### ب- التسميد فى الأراضى الجديدة :

تضاف الكميات الموصى بها على عدة دفعات حتى يمكن للنبات الاستفادة من هذه الأسمدة على أن يضاف سماد السوبر فوسفات قبل إجراء عملية العزيق حتى يتم تغطية السماد بالتربة .

بوتاسيوم	فوسفور	نيتروجين	
—	١٥	١٥	عند إعداد الأرض
—	٧,٥	١٥	بعد أسبوعين من الزراعة
٢٤	٢,٥	١٥	بعد شهر من الزراعة

### العناصر الصغرى:

وهي هامة لأن الأراضي الجديدة تفتقر إلى العناصر الصغرى الغذائية ولذلك يتم إضافة عناصر الحديد والزنك والمنجنيز بنسبة ١ : ١,٥ : ١ رشا بمعدل ٣ جم سلفات / لتر ماء أو في صورة مخلبية بمعدل نصف جم / لتر ماء وتضاف على مرتين الأولى بعد شهر من الزراعة بمعدل ٣٠٠ لتر ماء. والثانية بعد ٢٠ يوم من الرش الأولى بمعدل ٤٠٠ لتر ماء.

ويراعى أن يكون الرش في الصباح الباكر أو عند الغروب لتلافي تأثير الحرارة الشديدة وجفاف أسطح الأوراق.



## مكافحة الآفات

### ١- الحشائش :

يتأثر الفول السوداني بشدة بوجود الحشائش في أى فترة من فترات نمو.. ويزيد النقص في المحصول بزيادة كثافة الحشائش أو بوجود الحشائش النجيلية المعمرة لذا يلزم التعرف على الحشائش وطرق مكافحتها في الفول السوداني.

تنتشر أنواع الحشائش عريضة الأوراق كالرجلة والملوخية وعرف الديك والشبيط أو الحشائش النجيلية الحولية مثل النجيل المعمر.. يتم مكافحة هذه الأنواع عن طريق اتباع بعض الأساليب الزراعية مثل إعطاء رية كدابة لكي تثبت الحشائش ثم حرقها وهي فعالة في إنقاص الحشائش بدرجة كبيرة كما يفيد استخدام العزيق في التخلص من هذه الأنواع أولاً بأول وجمعها وحرقها .

### المكافحة الكيماوية :

١- الحشائش النجيلية الحولية : وتشمل حشائش الحمراء وسانديار.

● مبيد فيوزيليدي سوبر ١٢,٥ % EC بمعدل الاستخدام ١ لتر/ فدان ويتم الرش على نباتات المحصول والحشائش في طور ٢-٤ ورقات للحشائش.

٢- الحشائش النجيلية الكلية والحولية والمعمرة وتشمل النجيل البلدى المعمر.

● مبيد سلكت سوبر ١٢,٥ % EC بمعدل استخدام ١ لتر/ فدان ويتم الرش على نباتات المحصول والحشائش الحولية في طور ٢-٤ ورقات وفي البقع التى ينتشر فيها النجيل البلدى المعمر عندما يكون بارتفاع ١٠-١٥ سم.

● مبيد فيوزيلييد سوبر ١٢,٥ EC بمعدل ١ لتر/ هـدان .

ويتم رشاً عاماً على نباتات المحصول والحشائش الحولية فى طور ٢-٤ ورققات وفى البقع التى ينتشر فيها النجيل البلدى المعمر عندما يكون بارتفاع ١٠-١٥ سم.

ويراعى عدم الرش أثناء الظهيرة وعدم تكرار الرش حتى لا يزيد تركيز المبيد فى بعض المساحات مما يضر بالنباتات ولا يتم الرش قبل مرور يومين عقب رش المبيدات بعد الإنبات حتى لا يحدث لها غسيل مما يقلل من فعاليتها .

## ٢- النيماتودا :



أعراض الإصابة بثقود الجذور النيماتودي

من الأمراض التى تسبب خسائر كبيرة فى المحصول قد يصل إلى ٢٥% من محصول القرون ولذلك يوصى عند خدمة الأرض وإعدادها للزراعة، الاهتمام بالحرث فى اتجاهين متعامدين وترك الأرض فترة للتشميس لأن ذلك يقلل من أعداد النيماتودا بشكل كبير وضرورة التخلص من الحشائش واقتلاعها من جذورها حيث أنها تصاب بشدة بالنيماتودا .



### ● نيماتودا تعقد الجذور :

وتظهر الإصابة على هيئة أورام صغيرة على الجذور الثانوية - وإصفرار وضعف المجموع الخضرى - وتظهر الإصابة عند تكون المجموع الجذرى.

● مبيد تيميك ١٥ % G معدل الاستخدام ٧ كجم/ فدان .

ويستخدم نثرًا فى باطن الخط مع الزراعة ثم الرى مباشرة باليد وهى جافة.

● فيورادان ١٠ % G معدل الاستخدام ٧٠ كم/ فدان ويستخدم مرة واحدة عند الزراعة وقبل الرى على أن ينثر المبيد باليد وهى جافة.

● موكاب ١٠ % G معدل الاستخدام ٣٠ كجم/ فدان وتروى الأرض مباشرة بعد المعاملة.

### ٣- الحشرات :

دودة ورق القطن : وتظهر الإصابة بوجود لطم البيض على أوراق النباتات أو وجود اليرقات بأعمارها المختلفة - كذلك وجود أجزاء متأكلة من الأوراق نتيجة التغذية والحد الاقتصادى الحرج للاستخدام هو تواجد ٥ % نباتات مصابة على ألا يزيد الفقد فى المجموع الخضرى عن ٢٠ % أو ٥ لطة / ١٠٠ نبات .

تبدأ الإصابة بعد الزراعة بحوالى ١ - ١,٥ شهر وتزداد تدريجيًا مع زيادة المجموع الخضرى للنباتات .

- المبيد لانيت ٩٠ % SP بمعدل استخدام ٣٠٠ جم/ فدان.

- نيو درين ٩٠ % SP بمعدل ٣٠٠ جم/ فدان.





## الأمراض

### أعقان الجذور والذبول:

مظهر الإصابة - غياب الجور - موت البادرات قبل أو بعد ظهورها فوق سطح التربة نتيجة أعقان الجذور وتظهر الإصابة بعد الإنبات .  
وعند رفع البادرات تشاهد عليها تقرحات لونها بني تتحول إلى اللون الأسود وتذبل البادرات وتموت عند اشتداد الإصابة .  
وللتعرف على الذبول، يعمل شق طولى فى منطقة الجذور والساق فتشاهد تلون داخلى باللون المحمر يتحول إلى اللون البنى .

### المقاومة :

- زراعة أصناف مقاومة الأمراض.
- فرز التقاوى واستبعاد المصاب منها وحرق مخلفات النباتات المصابة .
- تطهير البذور .
- مبيد ريزو - إن ( ٣٠ مليون خلية / جم) بمعدل ٤ جرام / لتر ماء.  
تنقع البذور لمدة ١٢ ساعة - يحل ريزو - إن بماء خالى من الكلور مثل ماء القرعة أو البثر الارتوازي مع استخدام أوانى نظيفة .
- ريزو لكس تى ٥٠ % WP بمعدل ٣ جم / كجم تقاوى وتعامل التقاوى مع استخدام مادة لاصقة كالصمغ العربى ٥٠ جم/ لتر ماء حيث تندى التقاوى بالماء ثم يضاف إليها الصمغ العربى مع التقليب الجيد - ثم يضاف المبيد الفطرى مع التقليب ثم تنشر فى مكان ظليل قبل الزراعة بـ ٢٤ - ٤٨ ساعة .

- تزرع التقاوى المعاملة على عمق مناسب مع تجنب الإفراط فى الري والتسميد الأزوتى مع العناية بالتسميد البوتاسى والفوسفات .
- يجب اتباع دورة زراعية مناسبة حوالى ٢ سنوات .



تبقع الأوراق



عفن الجذور

#### • تبقع الأوراق:

تظهر الإصابة بالتبقع على الأوراق بعد شهرين من الزراعة حسب مستوى الرطوبة النسبية وخاصة فى حالة الري بالرش الذى يساعد على انتشار الإصابة وتتكون البقع بلون بنى محاطة بهالة صفراء تؤدي إلى موت الأنسجة وبالتالي تسبب خسائر كبيرة .

#### • المقاومة:

تستخدم بعض المبيدات عند بداية ظهور الإصابة أو بعد ٦٠ يوم من الزراعة ٢ رشات بفاصل ١٠ أيام .

- مبيد دل كب ٦٪ سائل معدل الاستخدام ٢٥٠ سم<sup>٣</sup> / ١٠٠ لتر ماء رشا على المجموع الخضرى .

- سوريل زراعى شيخ (كبريت زراعى) بمعدل ٢٠ كجم/ فدان - تعفريه النباتات فى الصباح الباكر عند ظهور الإصابة وتكرر المعاملة عند اللزوم.

- كوسيد (١٠١) WP %٧٧ بمعدل ١٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء رشاً على المجموع الخضري ويراعى الزراعة بتقاوى سليمة ومعاملتها بالمبيدات الفطرية مع تجنب الإفراط فى الري ، أو تكرار الزراعة فى نفس الأرض .

#### ● عضن الثمار :



اعراض الإصابة بأعفان ثمار الفول السودانى

- تتعضن الثمار نتيجة إصابتها بفطريات التربة ويختلف لونها حسب نوع الفطر.. تؤدي الإصابة إلى تشوه الثمار كما تؤثر على البذور بداخل الثمار من ناحية نسبة الزيت والبروتين وغالباً ما تظهر الإصابة بعد ٢,٥ - ٣ / أشهر من الزراعة .
- فرز التقاوى واستبعاد المصاب منها مع تطهير التقاوى بأحد المطهرات الفطرية السابقة والزراعة من خلال دورة ثلاثية .
- الاعتدال فى الري أثناء نمو النبات وخاصة قرب النضج وتلافى التقطيع عقب رية الحصاد مباشرة ويفضل أن يكون ذلك بعد ٤ أيام فى الأراضى الرملية وبعد أسبوع فى الأراضى الصفراء .
- العناية بالثمار أثناء نشرها للتجفيف بالتقليب المستمر حتى الجفاف .

- فى حالة الإصابة الشديدة تعامل التربة بالقيتا فاكس ثيرام أو الريزولكس T بمعدل ٢ كجم/ فدان حيث يستخدم المبيد نثرا بعد الزراعة بستة أسابيع تحت النباتات بعد خلطة بالتربة ثم الرى .

#### • العفن الأصفر المخضر :

ويسببه فطر الأسبرجلس فلافس أو الاسبرجلس يارازيتيكس .

وتؤدى الإصابة إلى ذبول النبات بصفة عامة وظهور نمو فطرى على القرون والبذور بلون يميل إلى الإصفرار وهى من الفطريات المفترزة للأفلاتوكسينات وتؤدى الظروف البيئية إلى انتشار المرض وإنتاج الأفلاتوكسين .. وهذه الظروف مثل :

١- الرطوبة النسبية أعلى من ٨٣ % .

٢- حرارة مثلى من ٢٠ - ٢٥ م .

٣- عدم انتظام الرى .

٤- حدوث جروح على الثمار نتيجة الإصابة ببعض الآفات الأخرى مثل يرقات عذارى دودة القطن - الحفار والتماتود - الديدان السلوكية - الدودة القارضة .

#### • الوقاية والعلاج:

- زراعة تقاوى سليمة مع اتباع دورة زراعية ثلاثية .

- الرى المنتظم .

- تجنب أصابة الثمار بالآفات الأخرى والتخزين فى مخازن جيدة التهوية ذات المواصفات الموصى بها .



## النضج والحصاد



التعرف على النضج



جمع المحصول



ثمرة مكبرة للتعرف على  
النضج

علامات النضج هي إصفرار الأوراق وسهولة تفتح القرون بالضغط عليها وتكون القشرة الداخلية باللون البنى الفاتح المحمر أى بعد حوالى ١١٥ - ١٢٠ يوم.

الحصاد - بعد ظهور العلامات - السابقة يمنع الري عن الفول السودانى وبعد أسبوع يتم تقطيع النباتات يدوياً وتترك لتجف بحيث تكون قرون النبات لأعلى لتعرضها لأشعة الشمس.

- تفصل القرون عن العرش وتنشر في طبقة لا يزيد سمكها عن ١٠ سم ويتم قلبها باستمرار مع تغطية القرون ليلاً لمنع زيادة الرطوبة عنها وتستمر عملية التجفيف لمدة حوالي أسبوعين.

- يتم فرز وتزرية القرون الجافة للتخلص من بقايا النباتات ولاستبعاد القرون المصابة والفارغة والمكسورة.

- تعبأ القرون الجافة في عبوات من الخيش وتخزن في مخزن جيد التهوية على أن تترك مسافات بين العبوات ولا تلامس الأرض وذلك لمنع تكون الأفلاتوكسين في الفول السوداني .

#### • إعداد محصول الفول السوداني للتصدير :

١- يجب تعبئة المحصول بعد إجراء الفرز والتدريج في أجولة جديدة تسمح بالتهوية .

٢- توضع العبوات على هيئة لوطات تحت إشراف لجنة من الحجر الزراعي حتى يمكن أخذ عينات للكشف عن تكوين أو وجود مادة الأفلاتوكسين بها.

٣- على المصدر تدوين كل البيانات الخاصة بالرسالة وبالشركة المصدرة والمستوردة .

٤- التخزين يكون في مخازن مبردة أو جيدة التهوية بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن ١٥-١٠ م حيث أن الفطريات المفترزة لمادة الأفلاتوكسين هي من ٢٠-٢٥ م ورطوبة نسبية أعلى من ٦٪ مع تزويد المخازن بالمرائح والشفافات لضمان خفض درجة الحرارة وتقليل الرطوبة النسبية داخل المخازن.

٥- يجب وضع الأجولة على البالتات خشب لمنع تعرضها للرطوبة الزائدة .

٦- يراعى أيضاً أن يتم الشحن في وسائل جيدة التهوية أو مبردة، مع الاستعانة بالمواد الماصة للرطوبة مثل السيلكا جيل للتأكد من عدم زيادة الرطوبة داخل الحاوية أثناء الرحلة.



## كيف ترفع إنتاجك من الفول السوداني بنسبة تزيد عن ٥٠% من الإنتاج الحالي؟

بعد دراسة مستفيضة ثبت لنا أن غمر التقاوى المقشورة في محلول هيدروكينون بتركيز ٢ جرام/ لتر ماء لمدة ١٢ ساعة ثم تنشر البذور في الهواء لعدة ساعات حتى التصاق القشرة الرقيقة على البذور مرة أخرى والزراعة مباشرة يعمل على القضاء على الفطريات الكامنة في التقاوى وارتفاع نسبة الإنبات والنمو الجيد للنبات .

تلك العملية تعمل على قتل الفطريات الكامنة بالبذور التي تعمل على خفض الإنتاجية بدرجة كبيرة . ومادة الهيدروكينون من مضادات الأكسدة وهي رخيصة السعر وتباع في عبوات تبدأ من ١٠٠ جرام وهي معروفة لدى معامل تحميض الأفلام فهي المادة الأساسية في إظهار النيجاتيف وكروت التصوير، وتباع أيضاً في شركات الكيماويات ولا يتعدى تكلفة الفدان أكثر من خمسة جنيهات علماً بأن هذه المادة وبهذه التركيزات تكاد تكون عديمة السمية للإنسان أو الحيوان وتغنى عن استعمال المبيدات السامة وغيرها .

المصدر: أ.د / محمد التوكيل استاذ امراض  
النبات - كلية الزراعة - جامعة المنصورة.





## المراجع

- ١. د. د. محسن آدم عمر، د. على عيسى نوار، د. محمد عبد الستار أحمد - زراعة محاصيل الحقل فى الأراضى الجديدة والصحراوية - مشروع تدريب الخريجين ١٩٩٦ .
- ١. د. د. على الخشن - زراعة المحاصيل - دار المعارف ١٩٩٣ .
- ١. د. د. حامد محمود البلقينى - زراعة المحاصيل المصرية - مطبعة النصر.
- النشرت الفنية لزراعة المحاصيل ٢٠٠٤ - مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة (٨٧٩) .
- ١. د. د. يوسف حسين الداودى - آفات الفول السودانى التى لها علاقة بالتصدير - نشرة فنية ٥٨٣ - ٢٠٠٠ مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة.
- د/ بدر عبد العزيز الأحمر - الفول السودانى نشرة رقم ١٤٩ .



# الفهرس

٣	مقدمة
٥	القول السوداني
٨	الفوائد الصحية للقول السوداني
١١	الوصف النباتي
١٤	ميعاد الزراعة
١٦	التلقيح البكتيري للقول السوداني
١٧	طريقة الزراعة
٢١	مكافحة الآفات
٢٤	الأمراض التي تصيب المحصول
٢٨	النضج والحصاد
٣٠	كيف ترفع إنتاجك من القول السوداني؟
٣١	المراجع

